

NAVODILO ZA UPORABO

Immunal 80 mg tablete

Echinacea purpurea L., herba, succus siccum

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolje koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 7 do 14 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Immunal in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Immunal
3. Kako jemati zdravilo Immunal
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Immunal
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO IMMUNAL IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Immunal je rastlinskega izvora; namenjeno je zvečanju odpornosti organizma. Vsebuje suhi sok, iztisnjen iz sveže cvetoče zeli škrlatne ehinaceje (*Echinacea purpurea* L., herba, succus siccum).

Škrlatna ehinaceja ali ameriški slamnik vsebuje učinkovine, ki zvečujejo nespecifično odpornost organizma. Zvečujejo število belih krvnih teles (granulocitov) in aktivirajo njihovo fagocitozno sposobnost ter s tem pospešijo uničevanje mikroorganizmov, ki so vdrti v telo. Dokazano je tudi protivirusno delovanje škrlatne ehinaceje na viruse gripe in herpesa.

Zdravilo Immunal uporabljajte:

- za zvečanje odpornosti organizma,
- za preprečevanje in hitrejše okrevanje pri prehladu in gripi,
- za lajšanje bolezenskih znakov pri lažjih virusnih in bakterijskih okužbah dihalnih poti (izcedek iz nosu, vnetje žrela, kašelj, utrujenost),
- ob dolgotrajnem zdravljenju kroničnih okužb z antibiotiki.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO IMMUNAL

Ne uporabljajte zdravila Immunal

- če imate napredujočo sistemsko bolezen, npr. tuberkulozo, levkoso, kolagenozo, multiplo sklerozo, aids, okužbo z virusom HIV ali druge avtoimunske bolezni,
- če ste preobčutljivi na škrlatno ehinacejo ali druge rastline iz družine košaric (kamilica, arnika, ognjič, rman),
- če ste preobčutljivi za katerokoli sestavino zdravila Immunal.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Immunal

Zdravilo Immunal ni primerno za otroke, mlajše od 4 let.

Uporaba drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Raziskav o medsebojnem delovanju škrlatne ehinaceje z drugimi zdravili niso izvedli.

Uporaba zdravila Immunal skupaj s hrano in pijačo

Medsebojno učinkovanje s hrano ni znano.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Ker ni dovolj podatkov o uporabi zdravila Immunal v času nosečnosti in dojenja, jemanja zdravila v teh obdobjih ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni podatkov o vplivu zdravila Immunal na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Immunal

Zdravilo Immunal vsebuje laktozo monohidrat. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO IMMUNAL

Odrasli in otroci, starejši od 12 let: 1 tableta tri- do štirikrat na dan

Otroci, stari od 6 do 12 let: 1 tableta enkrat do trikrat na dan

Otroci, stari od 4 do 6 let: 1 tableta enkrat do dvakrat na dan

Tablete vzemite z zadostno količino tekočine (en kozarec vode), ne glede na obrok hrane. Majhnim otrokom lahko tableto zdrobite na žlički in jo nato raztopite v vodi, čaju ali soku.

Za zadovoljiv učinek je treba zdravilo Immunal jemati vsaj en teden. Če se znaki bolezni ne izboljšajo v 7 do 14 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Zdravilo Immunal se sme neprekinjeno jemati največ osem tednov.

Zdravilo Immunal ni primerno za otroke, mlajše od 4 let.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Immunal, kot bi smeli

Če se po prevelikem odmerku pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Poročil o primerih prevelikega odmerjanja škrlatne ehinaceje ni.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Immunal,

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjega.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Immunal, ga vzemite takoj, ko bo mogoče. Če je že skoraj čas za naslednji odmerek, pozabljeni odmerek izpustite in ob predpisanem času vzemite samo naslednjega.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Immunal neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

V posameznih primerih se lahko pojavi preobčutljivostna reakcija z znaki: izpuščaj na koži, srbenje, otekel obraz, težko dihanje, vrtoglavica ali znižanje krvnega tlaka.

V tem primeru takoj prenehajte jemati zdravilo in se posvetujte z zdravnikom.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA IMMUNAL

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojni. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Immunal

Zdravilna učinkovina je suh sok, iztisnjen iz sveže, cvetoče zeli škrlatne ehinaceje – *Echinacea purpurea* L., herba, succus siccum (31 – 60 : 1).

Ena tableta vsebuje 80 mg suhega soka.

Pomožne snovi so magnezijev stearat, laktoza monohidrat, brezvodni koloidni silicijev dioksid, natrijev saharinat, vanilin, aroma češnje na nosilcih maltodekstrinu in arabskem gumiju.

Izgled zdravila Immunal in vsebina pakiranja

Zdravilo je na voljo v pretisnem omotu iz PVC/PVDC folije in aluminijaste folije.

V škatli je 20 tablet (1 pretisni omot po 20 tablet).

Tableta je okrogla, ravna in svetlo rjavo melirana.

Način izdaje zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Izdelovalec

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija.

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

Navodilo je bilo odobreno

18. 12. 2006

