

1.3.1	Cetylpyridinium chloride
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

NAVODILO ZA UPORABO

Neoseptolet z okusom divje češnje 1,2 mg pastile cetipiridinijev klorid

antiseptik za usta in žrelo

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Neoseptolet z okusom divje češnje in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Neoseptolet z okusom divje češnje
3. Kako jemati zdravilo Neoseptolet z okusom divje češnje
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO NEOSEPTOLETE Z OKUSOM DIVJE ČEŠNJE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Pastile Neoseptolet z okusom divje češnje delujejo lokalno protimikrobno. Vsebujejo antiseptik cetipiridinijev klorid, ki uničuje vrsto bakterij in glivic, v določeni meri pa ustavi tudi razvoj virusov. Pastile razkužujejo ustno votlino in žrelo ter tako lajšajo bolečino in občutek nelagodja, ki sta povezana z vnetji ustne votline in žrela. Predvsem pa preprečujejo razvoj hujših bakterijskih vnetij. Cetipiridinijev klorid zaradi dobre omočljivosti in zmanjšanja površinske napetosti prodira tudi na težko dostopna mesta sluznice ust in žrela ter ustavi rast bakterij. Neoseptolet z okusom divje češnje so prijetnega osvežilnega okusa po divji češnji.

Neoseptolet z okusom divje češnje priporočamo:

- za lokalno zdravljenje blažjih okužb v ustni votlini in žrelu (faringitis, laringitis, začetek angine),
- pri simptomih prehlada in gripe, kot so sklenje in praskanje v žrelu,
- pri vnetju dlesni (gingivitisu) in vnetju ustne sluznice (stomatitisu) zaradi okužbe,
- pri hripavosti zaradi prehlada in slabem zadahu.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO NEOSEPTOLETE Z OKUSOM DIVJE ČEŠNJE

Ne jemljite zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje

- če ste alergični (preobčutljivi) na cetipiridinijev klorid ali katerokoli sestavino zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje

1.3.1	Cetylpyridinium chloride
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

- Če imate **odprte rane v ustih** (npr. po ekstrakciji zob, kirurški odstranitvi mandljev), ker cetilpiridinijev klorid upočasni celjenje ran.
- Če imate **hujšo okužbo z visoko telesno temperaturo, glavobolom in bruhanjem**, obiščite zdravnika, še posebno, če se težave ne izboljšajo po treh dneh.
- Če ste **diabetik**, morate vedeti, da vsaka pastila vsebuje okrog 1 g maltitola. Zaradi počasne hidrolize in absorpcije v prebavilih maltitol le malo vpliva na raven krvnega sladkorja.
- Če imate **kronični kašelj in ste hripavi**, se morate posvetovati z zdravnikom.

Prosimo, posvetujte se z zdravnikom tudi, če so se gornje navedbe nanašale na vas kadarkoli v preteklosti.

Jemanje večjih odmerkov od predpisanih ni priporočljivo.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Ni znano, da bi Neoseptolet z okusom divje češnje vplivale na učinke drugih zdravil.

Uporaba površinsko aktivnih anionov (npr. zobna pasta) zmanjša učinkovitost cetilpiridinijevega klorida.

Jemanje zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo Neoseptolet z okusom divje češnje ne jemljite hkrati z mlekom, ker mleko zmanjšuje njihovo učinkovitost.

Zdravilo Neoseptolet z okusom divje češnje ne jemljite pred obrokom ali med njim. Po jemanju Neoseptolet z okusom divje češnje vsaj eno uro ne jejte in ne pijte.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

O varnosti zdravila med nosečnostjo in dojenjem ni dovolj podatkov, zato jemanja v tem obdobju ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Neoseptolet z okusom divje češnje vplivale na sposobnost za upravljanje vozil in strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje

Pastile vsebujejo naravno barvilo, zato lahko na svetlobi sčasoma posvetlijo, kar pa ne vpliva na učinkovitost zdravila.

Pastile vsebujejo tekoči maltitol in maltitol (E965). Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO NEOSEPTOLETE Z OKUSOM DIVJE ČEŠNJE

Pri jemanju zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Običajni odmerek je:

Odrasli in otroci, starejši od 12 let

Po 1 pastilo raztopite v ustih na 2 do 3 ure. Priporočamo do 8 pastil na dan.

Otroci od 10. do 12. leta

Po 1 pastilo raztopite v ustih na 3 do 4 ure. Priporočamo do 6 pastil na dan.

1.3.1	Cetylpyridinium chloride
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

Otroci od 4. do 10. leta

Po 1 pastilo raztopite v ustih na 3 do 4 ure. Priporočamo do 4 pastile na dan.

Neoseptolet z okusom divje češnje ne priporočamo otrokom, mlajšim od 4. let.

Ne jemljite Neoseptolet z okusom divje češnje neposredno pred obrokom ali med njim.

Po jemanju zdravila vsaj eno uro ne jejte in ne pijte.

Če menite, da je učinek zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Glede na količino učinkovin v eni pastili je možnost prevelikega odmerjanja zelo majhna. Zaužitje večje količine pastil lahko povzroči želodčno-črevesne težave, slabost, bruhanje in drisko. V takem primeru prenehajte z jemanjem, popijte veliko vode ali mleka in se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Neoseptolet z okusom divje češnje

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Neoseptolet z okusom divje češnje neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki so po pogostosti razvrščeni v naslednje skupine:

Zelo pogosti	Pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov
Pogosti	Pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov
Občasni	Pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov
Redki	Pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov
Zelo redki	Pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov
Neznana pogostnost	Pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Redki:

- Želodčno-črevesne težave zlasti pri občutljivih ljudeh in pri jemanju večjih odmerkov od predpisanih.

Zelo redki:

- Preobčutljivostna reakcija.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA NEOSEPTOLETE Z OKUSOM DIVJE ČEŠNJE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

1.3.1	Cetylpyridinium chloride
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago in svetlobo.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Neoseptolet z okusom divje češnje

- Zdravilna učinkovina je cetilpiridinijev klorid. Ena pastila vsebuje 1,2 mg cetilpiridinijevega klorida.
- Pomožne snovi so tekoči maltitol, maltitol (E965), manitol (E421), levomentol, eterično olje limone, glicerol (E422), deviško ricinusovo olje, brezvoden koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat (E572), povidon, farmacevtski voski (čebelji vosek (E901), karnauba vosek (E903), šelak (E904)), titanov dioksid (E171), aroma divje češnje, naravno rdeče barvilo (karminska kislina (E120), natrijev hidroksid (E542), citronska kislina (E330)).

Izgled zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje in vsebina pakiranja

Pastile so okrogle, rahlo izbokle in vijolične barve.

Na voljo so škatle po 18 pastil. Opremljene so z 2 pretisnima omotoma po 9 pastil.

Način in režim izdaje zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Navodilo je bilo odobreno

17. 6. 2010