

Uporaba / Upotreba

Novalac PLUS začetno mleko je primož za dojenčke od rojstva do 6. meseca starosti, koi jih matere ne dojijo ali so le delno dojeni. Uporablja ga lahko vse dokler dojenčka hrani po steklenički. Ko Novalac PLUS začetno mleko več ne nasiti dojenčka, svetujemo, da preideš na Novalac 1 začetno mleko. Po dopolnjenem 6. mesetu starosti svetujemo prehod na Novalac 2 nadaljevalno mleko. Novalac PLUS je del obsežne linije proizvodov, razvitetih posebej za zadovoljevanje prehranskih zahtev dojenčkov. *Novalac PLUS početna mliječna hrana primjerena je za hranjenje dojenčadi od rojstva do 6. meseca starosti, ako majka ne doji ili oči dolomito doji. Možete ju koristiti sva dojenčke hrani na bočici.* Ako Novalac PLUS početna mliječna hrana dovoljno ne zaslužuje dojenčce, svetujemo da preideš na Novalac 1 početnu mliječnu hrano. Nakon 6 mjeseci starosti preporedujemo prijelaz na Novalac 2, prijelaznu mliječnu hrano. Novalac PLUS dio je opsežne linije proizvodov posebno razvijenih za zadovoljevanje prehranskih potreba dojenčadi.

Pomembno opozorilo / Važna napomena

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Mleko Novalac se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, prehrane, farmacije ali druge strokovne osobe, ki je odgovorna za skrb materi in otroka. Posebna pozornost pri uporabi Novalac mleka je potrebna pri dojenčkih z slabšljanim imunskim odzivom, nedonošenčkih ali novoorjenčkih z nizko porodno tezo ter v primeru alergijskih reakcij na mlečne beljakovine. Nepravilna priprava ali shranjevanje lahko povzroči tveganje za bolezen. Pri hranjenju po steklenički poskrbite, da stik med mlekom in zobni vasega otroka ni predolgov ali pogost, ker to povečuje možnost za nastanek kariesa. Vedeni umilte zobe vasega otroka po zadnjem nočnem obroku. *Majčino mlejko najboljša je hrana za dojenčke. Mliječna hrana za dojenčke je sama premo preporučena stručnjaka s področja medicine, prehrane, farmacije ali druge društne osobe odgovorne za zdravje majke i djeteta. Poseban oprez kod upotrebe mliječne hrane Novalac potreban je kod dojenčadi s slabšljanim imunskim odzivom, nedonošenčkih ali novoorjenčkih niske porodno težine te kod alergijskih reakcija na mliječne beljakovine. Nepravilna priprava ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravje. Pri hranjenju na bočici pazite da kontakt izmedu mliječne hrane i zuba vasega djeteta ne bude predug ili prečest jer to povečava mogučnost nastanka kariesa. Uvijek operite zube djetetu nakon zadnjeg nočnog obroka.*

Odmerjanje / Doziranje

Starost dojenčka (meseci) / Starost dojenčeta (mjeseci)	0-1	1-2	2-4	4-6
Stevilo obrokov na dan / Broj obroka na dan	6	5	5	4
Stevilo meric za pripravo enega obroka / Broj mjerica za pripravo jednog obroka	3	4	5	7
Količina vode (ml) / Količina vode (ml)	90	120	150	210

Do vrha napolnjena in do roba poravnana priložena merica vsebuje 4,3 g Novalaca PLUS. Eno merico raztopite v 30 ml vode. Dnevno količinu hrane in stevilo obrokov prilagodite dojenčkovemu starosti in njegovim potrebam. Če zdravnik ne svetuje drugače, upoštevajte priporočila v tabeli. */ Do vrha napolnjena i do roba poravnana priložena merica sadržava 4,3 g Novalaca PLUS. Jednu mjericu razstopite v 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčka. Ako liječnik drugače ne svetuje, uvažite preporuke u tablici.*

- Vedeni pripravite svež obrok.
- Hranite na suhem mestu, zaščiteno pred topotlo in svetlobo.
- Izdelek je uporaben najmanj do datuma, odstisnjenega na dnu pločevinke.
- Po prvem odprtju pločevinke, morate vsebinsko porabiti v treh tednih.
- Po vsaki uporabi pločevinko dobro zaprite.
- Ne shranjujte nepotpognjene obroke. Ostanek zavržite.
- Ne shranjujte svježi obrok.
- Čuvajte na suhom mestu, zaščiteno od svjetla i topline.
- Proizvod je najbolje uporabljiti do datuma oznaknega na dnu limenke.
- Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj uporabite v roku od 3 tedna.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte neponojeni obrok. Ostatak bacite.

Pakirano v kontrolirani atmosferi. *Pakirano u kontroliranoj atmosferi.*

Sedelč podjetja: UP Medi-Europa SA, Švicarska • Distributer: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
Sjedište poduzeća: UP Medi-Europa SA, Svicaarska • Kontakt za Hrvatsku: Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, Zagreb.



www.novalac.si
www.novalac.hr

* kot zahteva zakonodaja za vse začetne formulе za dojenčke je propisano zakonodajočim začetno mleko za dojenčke

Novalac

PLUS

Začetno mleko za dojenčke
Početna mliječna hrana
za dojenčad

Vsebuje DHA*
Sadržava DHA*



0-6 mesecev/
mjeseci

400 g e

Hranilna vrednost / Hranjiva vrijednost

	100 g	100 ml
Energijska vrednost/Energetska vrijednost	kJ kcal	2118 506
Maččobe/Masti	g	26 1,6
- od tega nasičene maččobe/ od kofij zasićene masne kiseline	g	4,5 0,6
- linolna kislina/linolna kiselina	mg	405 53
- alfa linolenska kislina/alfa linolenska kiselina	mg	120 16
- DHA (dokozahexaenska kislina/ dokozahexaenska kiselina)	mg	60 8
Ara (arachidonska kislina/arachidonska kiselina)	mg	56,8 7,4
Ogiljki hidrati/Ugljikohidrati	g	56,8 7,4
- od tege sladkorji /od kofij šećeri	g	1,9 0,2
GOS (Galaktoligosaharidi)	g	1,3 0,2
Prehranske vlaknine/Vlakna	g	10,4 1,4
Beljakovine/Bjelančevine	g	11,2 1,5
Vitamini	µg	8,7 1,1
Tiamin	µg	60 7,8
Riboflavin	µg	0,8 0,10
Niacin	µg	1,2 0,2
B6	µg	0,5 0,07
Folna kislina/Folna kiselina	µg-DFE	80 10
Folat	µg	150 20
B12	µg	1,5 0,2
Biotin	µg	18 2,3
Pantotsenska kislina/Pantotsenska kiselina	mg	5 0,7
Minerali		
Natrij	mg	165 21
Kalij	mg	525 68
Klorid	mg	400 52
Kalcij	mg	380 49
Fosfor	mg	240 31
Magnезij	mg	45 5,9
Železo/Željezo	mg	4 0,5
Cink	mg	3,3 0,4
Baker/Bakar	mg	0,38 0,05
Mangan	mg	0,045 <0,06
Fluorid	mg	<0,45 <0,06
Selen	µg	22 2,9
Jod	µg	95 12
Holin/Kolin	mg	170 22
Inozitol	mg	80 10,4
Tavin/Taurin	mg	40 5,2
L-karnitin	mg	20 2,6
Nukleotidi	mg	18,6 2,4

Sestavine / Sastočci

Posebno mleko, mlečne beljakovine, rastlinska olja (palmitovo, kokosovo, sojino, repino), laktosa, galaktooligosaharidi (mleko), rible olje (DHA), emulgator (sojino lecitin), trikalijev citrat, kalijev klorid, holin bitartrat, trikalijev fosfat, kalijev klorid, trikalijev citrat, olje glijive Mortierella alpina (ARA), L-tirozin, vitamini (retinolacetat, tiaminjavi hidroklorid, cianokobalamin, riboflavin, pirodoksinski hidroklorid, natrijev-L-askorbat, kolekaliferol, DL-alfa-tokoferol acetat, fitomenadion, D-biotin, folna kislina, nikotinamid, kalijev D-pantotenat), natrijev klorid, željezni difosfat, taurin, trikalijev citrat, kalijev hidroklorid, inozitol, L-triptofan, magnezijev klorid, magnezijev oksid, nukleotidi (CMP, UMP, AMP, GMP), L-karnitin, cinkov sulfat, kalijev jodid, antoksidanti (ekstrakt bogat s tolidolom, askorbl palmitat), natrijev selenit, bakrov sulfat, manganov sulfat, *Obrazno mlejko, mliječne bjelančevine, biljna ulja (palmitino, kokosovo, sojino, ulje ulje repice), laktosa, galaktooligosaharidi (mleko), rible ulje (DHA), emulgator (sojino lecitin), trikalijev citrat, kalijev klorid, holin bitartrat, trikalijev fosfat, kalijev klorid, trikalijev citrat, ulje glijive Mortierella alpina (ARA), L-tirozin, vitamini (retinolacetat, tiamin-hidroklorid, cianokobalamin, riboflavin, pirodoksinski hidroklorid, natrijev-L-askorbat, kolekaliferol, DL-alfa-tokoferol acetat, fitomenadion, D-biotin, folna kislina, nikotinamid, kalijev D-pantotenat), natrijev klorid, željezni difosfat, taurin, trikalijev citrat, kalijev hidroklorid, inozitol, L-triptofan, magnezijev klorid, magnezijev oksid, nukleotidi (CMP, UMP, AMP, GMP), L-karnitin, cinkov sulfat, kalijev jodid, antoksidanti (ekstrakt bogat tolidolom, askorbl palmitat), natrijev selenit, bakrov sulfat, manganov sulfat.*

Navodila za pripravo / Uputa za pripremu

- PRED VSAKO PRIPRAVO OBROKA SI UMJITE ROKE. I PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE.
- 1 Stekljeničko in pokrovček z dudo prekuhajte v vodi. Vre naj vsaj 5 minut. / Bočicu in poklopac sa dudom prekuhajte v vodi. Neka ključa bar 5 minut.
- 2 Vodo za pripravo obroka zavrite u pokrijetem lončku. Vre naj vsaj 5 minut. / Vodu za pripremu obroka prekuhajte u pokrijetom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.
- 3 Vodo na lončku ohladite na 40 °C in jo prelijte v stekleničko. / Vodu na lončiću ohladite na 40 °C i prelijite je u bočicu.
- 4 V stekleničko s priloženo merico usijte predpisano stevilo meric. / Uspite ubodčiu propisani broj mjerica pomoci priložene mjerice.
- 5 Stekljeničko zaprite in dobro pretresite, da se prašek popolnoma raztopi. / Bočicu zatvorite i dobro promučajte da se prašak potpuno otopi.
- 6 Pripravljen obrok ohladite do mlajčnega (37 °C), ozi. dokler na koži ne čujete ne toplo ne hladno. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.