

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE TO NAVODILO, KER VSEBUJE POMEBNE PODATKE ZA VAS!

To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.

Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v enem do dveh tednih morate obiskati zdravnika.

BEKUNIS TABLETE PROTI ZAPRTJU **45 gastrorezistentnih tablet**

Zdravilna učinkovina je: suhi vodni ekstrat plodov ozkolistne sene (*Sennae angustifoliae fructus extractum siccum, aquosum*)

Pomožne snovi so: mikrokristalna celuloza; magnezijev stearat; smukec; titanov dioksid (E 171); natrijev karmelozat; želatina; polisorbat 80; makrogol 6000; brezvodna laktoza; saharoza; kopolimer metakrilne kisline in etilakrilata 1:1; arabski gumi, pripravljen z razprševalnim sušenjem; kalcijev karbonat (E 170); tekoča glukoza; stearinska in palmitinska kislina 45; koloidni brezvodni silicijev dioksid; montanglikolni vosek.

Farmacevtska oblika: gastrorezistentna tableta

Oprema in vsebina: škatla s PP (polipropilen) vsebnikom-45 tablet

Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet: BITRADE d.o.o., Jelovškova 9, 1234 Mengeš

Ime in naslov izdelovalca: ROHA Arzneimittel GmbH, Rockwinkeler Heerstrasse 100, Bremen, Nemčija

Kaj so BEKUNIS tablete proti zaprtju in za kaj se uporabljajo?

1 gastrorezistentna tableta vsebuje 150 do 220 mg suhega vodnega ekstrakta plodov ozkolistne sene, tako da ustreza 20 mg hidroksiantracenskih derivatov, izraženih kot senozid B. Bekunis tablete proti zaprtju so odvajalo rastlinskega izvora, ki učinkuje po 8 do 10 urah. Namenjene so **kratkotrajni** uporabi za spodbujanje odvajanja blata pri zaprtju.

Kaj morate vedeti, preden uporabite BEKUNIS tablete proti zaprtju?

-Bekunis tablet proti zaprtju ne smete jemati v primeru črevesne zapore (ileusa); črevesnih vnetnih bolezni npr. pri Crohnovi bolezni, ulceroznem kolitisu, vnetju slepiča; pri trebušnih bolečinah neznanega izvora; v primeru hude dehidracije z motnjo ravnotežja vode in elektrolitov. Tablet ne smejo jemati otroci, mlajši od 12 let.

-Bodite posebno pozorni na naslednje: Potreben odmerek je lahko individualno različen, Driska je znak prevelikega odmerka. Brez zdravniškega priporočila Bekunis tablet proti zaprtju ne smete uživati dalj časa (ne dalj kot 1 do 2 tedna). **Daljša uporaba odvajal lahko zveča lenobnost črevesja. Tablete naj se uporabljajo le tedaj, ko zaprtja ni mogoče odpraviti s spremenjeno prehrano ali vlakninskimi odvajali. Bekunis tablete proti zaprtju niso primerno sredstvo za hujšanje.** Če težave ne prenehajo ali, če se pojavijo neželeni učinki se posvetujte z zdravnikom.

-Nosečnost in dojenje: V prvih treh mesecih nosečnosti smete Bekunis tablete jemati le, če zaprtja ni mogoče odpraviti s spremembo prehrane ali s snovmi, ki v vodi nabrekajo. Med nosečnostjo in dojenjem jemljite tablete le po poprejšnjem dogovoru z zdravnikom. Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

-Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev: Ni znano, da bi Bekunis tablete proti zaprtju vplivale na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

-Na kaj morate biti pozorni, če jemljete druga zdravila? V primeru kronične uporabe oz. zlorabe tablet je možna okrepitev delovanja srčnih glikozidov in vpliv na delovanje antiaritmikov zaradi izgube kalija. Izgubo kalija lahko okrepi tudi sočasno jemanje tiazidov, kortikosteroidov in korenin golostebelnega sladkega korena (*Liquiritiae radix*).

Kako uporabljati BEKUNIS tablete proti zaprtju?

Po večernem obroku pred spanjem zaužijte eno tableto z malo tekočine. Odmerek spremenite le po dogovoru z zdravnikom ali farmacevtom.

Možni neželeni učinki: V posameznih primerih se pojavijo črevesni krči ali diareja. V teh primerih je treba zmanjšati odmerek tablet. V primeru kronične uporabe oz. zlorabe tablet je mogoča večja izguba vode in soli, predvsem kalijevih soli, iz telesa. Pojavita se lahko tudi albuminurija in hematurija, pa tudi pseudomelanosis coli (pigmentacije debelega črevesja), ki pa je neškodljiva in običajno izgine po prenehanju jemanja tablet. Izguba kalija lahko povzroči motnje delovanja srca in mišično slabost, še posebej v primeru sočasnega jemanja srčnih glikozidov, diuretikov in kortikosteroidov. Če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni naveden v tem navodilu za uporabo, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Shranjevanje in rok uporabnosti: Vsebnik hranite tesno zaprt na suhem mestu pri temperaturi do 25 °C.

Zdravilo je uporabno do datuma, ki je odtisnjen na embalaži. Po datumu izteka roka uporabnosti zdravila ne smete uporabljati.

ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM!

Način izdajanja zdravila: Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Datum zadnje revizije navodila: 18.09.2003