

Šešez podjelija: UP Medi-Europa SA, Švica • Drava porekla: Nemčija • Distributer: Medis, d.o.o., Brncičeva 1, Ljubljana
Sjedište podizlaga: UP Medi-Europa SA, Švicarska • Zemlja podrijetla: Njemačka • Kontakt za Hrvatsku: Medis Adria d.o.o.,
Kolarova 7, Zagreb • Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heenerer str. 49, 39576 Stenndal – Njemačka. Proizvedeno u Njemačkoj, DE ST 00317 EG, izvezeno iz Slovenije.
Zastupnik za BiH: Medis International d.o.o., Sarajeva, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, BiH.

Uporaba / Upotreba

Novalac 2 nadaljevalno mliječko je primerno za dojenčice, starije od šestih mjeseci. Je del raznolike prehrane, ki se v prvih šestih mesecih življenja ne sme uporabljati kot nadomestek za materino mleko. Primeren je kot dopolnilna hrana, če dojenje ne zadošča in kot nadaljevalna hrana po uporabi Novalac 1 začetnega mleka. Novalac 2 je vir vitamina D, ki je potreben za normalno rast in razvoj kosti pri otrocih. Odlučitev o začetku uporabe dopolnilne hrane, vključno z vsakršno izjemo do šestega meseca starosti, se sprejme samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, farmacije oziroma prehrane ali drugih strokovnjakov s področja nege matere in otroka, ob upoštevanju individualnih posebnih potreb za rast in razvoj dojenčka. Novalac 2 je del obsežne linije proizvodov, razvitih posebej za zadovoljevanje prehranskih zahtev dojenčkov. Za otroke, starije od 12 mesecev svetujemo prehod na Novalac 3 Junior mleko za otroke. / Novalac 2 mliječna hrana pripravena je za dojenčad od 6. mjeseca starosti nadalje. Dio je raznolike prehrane koja se u prvih šest mjeseci ne smije koristiti kao nadomjestak za majčino mlijeko. Primjeren je kao dopuna hrani ako dojenje nije dovoljno i kao nastavak hranjenja nakon upotrebe Novalac 1 početne mliječne hrane. Novalac 2 je izvor vitamina D, koji je potreban za normalan rast i razvoj kostiju kod djece. Odluka o početku upotrebe raznolike prehrane, uključujući svaki izuzetak do šestog mjeseca starosti, donosi se samo prema preporukama stručnjaka s područja medicine, farmacije oziroma prehrane ili drugih stručnjaka s područja medicine, farmacije oziroma prehrane ili drugih stručnjaka s područja nege majke i djeteta, uz poštovanje individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčadi. Novalac 2 dio je opsežne linije proizvoda posebno razvijenih za zadovoljevanje prehranskih potreba dojenčadi. Nakon 12 mjeseci starosti preporučujemo prijelaz na Novalac 3 Junior napitak na bazi mlijeka.

Pomembno opozorilo / Važna napomena

Materino mleko je najbolja hrana za dojenčice. Mleko Novalac se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, prehrane, farmacije ali druge strokovne osebe, ki je odgovorna za skrb matere in otroka. Posebna pozornost pri uporabi Novalac mleka je potrebna pri dojenčkih z oslabljenim imunskim odzivom, nedonošenčkih ali novorojenčkih z nizko porodno težo ter v primeru alergijskih reakcij na mlečne beljakovine. Nepravilna priprava ali shranjevanje lahko predstavlja tveganje za zdravje. Pri hranjenju po steklenički poskrbite, da stik med mlekom in zobmi vašega otroka ni predolgi ali pogost, ker to povečuje možnost za nastanek karijesa. Vedno umijte zobe vašega otroka po zadnjem nočnem obroku. / Majčino mlijeko najbolja je hrana za dojenčad. Mliječna hrana za dojenčad koristi se samo prema preporukama stručnjaka s područja medicine, prehrane, farmacije ili druge stručne osobe odgovorne za zdravlje majke i djeteta. Posebna opreza kod upotrebe mliječne hrane Novalac potrebna je kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođeničadi niske porodajne težine te kod alergijskih reakcija na mliječne bjelancevine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Pri hranjenju na bočicu pazite da kontakt između mliječne hrane i zuba vašeg djeteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube djeteta nakon zadnjeg noćnog obroka.

Odmerjanje / Doziranje

Starost dojenčka (meseći)/Starost dojenčeta (mjeseci)	> 6
Teža dojenčka (kg)/Težina dojenčeta (kg)	> 7,5
Število obrokov na dan/Broj obroka na dan	3*
Število meric za pripravo enega obroka/Broj mjerica za pripremu jednog obroka	7
Količina vode (ml)/Količina vode (ml)	210

* kot del raznovrstne prehrane / kao dio raznolike prehrane

Do vrha napolnjena in do roba poravnana priložena merica vsebuje 4,3 g Novalaca 2. Eno merico raztopite v 30 ml vode. Dnevno količino hrane in število obrokov prilagodite dojenčkovi starosti in njegovim potrebam. Če zdravnik ne svetuje drugače, upoštevajte priporočila v tabeli. / Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadržava 4,3 g Novalaca 2. Jednu mjericu rastopite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako liječnik drugačije ne savjetuje, uvažite preporuke u tablici.

Vedno pripravite svež obrok. • Hranite na suhem mestu, zaščiten pred toploto in svetlobo. • Izdelek je uporaben najmanj do datuma, odtisnjenega na dnu pločevinke. • Po prvem odprtju pločevinke, morate vsebino porabiti v treh tednih. • Po vsaki uporabi pločevinke dobro zaprite. • Ne shranjujte nepopitega obroka. Ostanek zavrzite. / Uvijek pripremite svježi obrok. • Čuvajte na suhom mjestu, zaštićeno od svjetla i topline. • Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma odtisnutog na dnu limenke. • Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna. • Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite. • Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.

Pakirano v kontrolirani atmosferi. / Pakirano u kontroliranoj atmosferi.


1507M16D 200007224 30119920



MEDIS www.novalac.net

Novalac 2

Nadaljevalno mleko za dojenčke
Prijelazna mliječna hrana
za dojenčad

6-12 mesecev/
mjeseci

400 g e

Hranilna vrednost/Hranjiva vrijednost

	100 g	100 ml
Energijska vrednost / Energijska vrijednost	kcal	2075,2 269,8
Maščobe / Masti	g	23 3
- od tega nasičene maščobe/ - od kojih zasićene masne kiseline	g	11,1 1,4
- od tega enkrat nenasičene maščobe / - od kojih jednostruko nenasićene masne kiseline	g	5,9 0,8
- od tega večkrat nenasičene maščobe / - od kojih višestruko nenasićene masne kiseline	g	4,8 0,6
Ogljikovi hidrati / Ugljikohidrati	g	61 7,9
- od tega sladkorji / od kojih šećeri	g	42,1 5,5
Beljakovine / Bjelancevine	g	11 1,4
Sol	g	0,375 0,05
Vitamins	µg RE	450 58,5
A	µg	400 52
B1	µg	800 104
B2	µg	300 39
B6	µg	1,5 0,2
B12	µg	60 7,8
C	mg	8,1 1,1
D3	µg	8,7 1,1
E	mg α-TE	30 3,9
K1	µg	4,5 0,6
Niacin	mg	2,4 0,3
Pantotenska kislina / kislina	µg	60 7,8
Folna kislina / kislina	µg	15 2
Biotin	µg	150 19,5
Minerali	mg	620 80,6
Natrij	mg	415 54
Kalij	mg	635 82,6
Klorid	mg	360 46,8
Kalcij	mg	45 5,9
Fosfor	mg	6 0,8
Magnezij	mg	4,5 0,6
Železo / Željezo	µg	95 12,4
Cink	µg	400 52
Jod	µg	35 4,6
Baker / Bakar	µg	10 1,3
Mangan	µg	<450 <59
Selen	µg	60 7,8
Fluorid	µg	
Holin / Kolin	mg	

Sestavine / Sastojci

Posneto mleko, maltodekstrini, laktoza, rastlinska olja (palmovo, sojino, kokosovo), kalcijev karbonat, emulgator (sojin lecitin), kalijev hidroksid, kalcijev klorid, trikalcijev fosfat, vitamini (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, biotin, folna kislina, niacin, pantotenska kislina), natrijev klorid, holin bitartrat, železov sulfat, L-triptofan, trikalcijev citrat, magnezijev oksid, cinkov sulfat, antioksidanti (tokoferoli), bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat, natrijev selenit. / Obrano mlijeko, maltodekstrini, laktoza, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), kalcijev karbonat, emulgator (sojin lecitin), kalijev hidroksid, kalcijev klorid, trikalcijev fosfat, vitamini (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, biotin, folna kiselina, niacin, pantotenska kiselina), natrijev klorid, kolin bitartrat, željezov sulfat, L-triptofan, trikalcijev citrat, magnezijev oksid, cinkov sulfat, antioksidansi (tokoferoli), bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat, natrijev selenit.

Navodila za pripravo / Uputa za pripremu

**PRED VSAKO PRIPRAVO OBROKA
SI UMIJTE ROKE. / PRIJE PRIPREME
SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU.**



1 Stekleničko in pokrovček z dudo prekuhajte v vodi. Vre naj vsaj 5 minut. / Bočicu i poklopac sa dudom prekuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.



2 Vodo za pripravo obroka zavrite v pokritem lončku. Vre naj vsaj 5 minut. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.



3 Vodo v lončku ohladite na 40 °C in jo prelijte v stekleničko. / Vodu u lončiću ohladite na 40°C i prelijte je u bočicu.



4 V stekleničko s priloženo merico vsjete prepisano število meric. / Uspite u bočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.



5 Stekleničko zaprite in dobro pretresejte, da se prašek popolnoma raztopi. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašek potpuno otopi.



6 Pripravljen obrok ohladite do mlačnega (37 °C), oz. dokler na koži ne čutite ne toplo ne hladno. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37°C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.