

NAVODILO ZA UPORABO

Gel proti potenju

metenamin

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se posvetujte z zdravnikom.

1. KAJ JE ZDRAVILO GEL PROTI POTENJU IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Gel proti potenju je namenjen obvladovanju prekomernega znojenja in neprijetnega vonja na predelih, ki se prekomerno znojijo (stopala, dlani ali pod pazduho). Je nemasten in ne pušča

madežev. Se dobro oprime kože, ko se temeljito posušijo, ni lepljiv. Zdravilna učinkovina metenamin v kislem okolju na koži počasi razpade v amoniak in formaldehid. Formaldehid uničuje bakterije in zapira izvodila žlez znojnic, s čimer zmanjšuje neprijeten vonj in potenje.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO GEL PROTI POTENJU

Ne uporabljajte zdravila

Gel proti potenju

- če ste alergični na metenamin (urotropin) ali na katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se na mestu uporabe Gela proti potenju pojavijo znaki vnetja ali pekoča bolečina, prenehajte z uporabo. Zdravila ne nanašajte na vneto ali poškodovano kožo in na sluznice in ga ne uporabljajte neprekinjeno več kot 7 dni! Če otrok pogoltne zdravilo Gel proti potenju, takoj poiščite zdravniško pomoč!

Otroci in mladostniki

Uporabe pri otrocih, mlajših od 12 let, ne priporočamo.

Druga zdravila in zdravilo

Gel proti potenju

Brez posveta z zdravnikom sočasno nanašanje drugih zdravil na prizadete predele kože odsvetujemo, ker o medsebojnem delovanju ni podatkov.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden uporabite to zdravilo.

Uporabe v obdobju nosečnosti in dojenja iz previdnosti ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi uporaba ob z navodili skladni uporabi vplivala na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Zdravilo Gel proti potenju vsebuje

Na koži ob razpadu metenamina v kislem okolju nastaja **formaldehid**, ki lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO GEL PROTI POTENJU

Gel na umite in osušene predele telesa, ki se prekomerno znojijo (pod pazduho, stopala, dlani), nanesite **enkrat dnevno**. Brez prekinitve ga uporabljajte največ **sedem dni**. Po desetih dneh lahko uporabo ponovite.

Po nanosu se izogibajte stiku rok z očmi ali sluznicami. Roke si skrbno umijte.

Uporaba pri otrocih

Zdravila Gel proti potenju ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 12 let.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Gel proti potenju, kot bi smeli

Če ste uporabili prevelik odmerek Gela proti potenju, lahko pride do draženja (pordelosti, pekočega občutka, dermatitisa). V tem primeru gela ne nanašajte, dokler znaki draženja popolnoma ne izzvenijo. Prizadeto mesto po potrebi umijte s hladno vodo in blago milnico. Prepogosta ali dolgotrajna uporaba lahko vodi v trajnejše poškodbe kože.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa ne pojavijo pri vseh uporabnikih.

Na mestu uporabe lahko pride do vnetja, pordelosti ali pekočega občutka ali preobčutljivostnih reakcij. V takšnem primeru prenehajte z uporabo in prizadeto mesto po potrebi umijte z blago milnico ali hladite.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni

v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke Sektor za farmakovigilanco Nacionalni center za farmakovigilanco Slovenčeva 22, SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (8) 2000 500
Faks: + 386 (8) 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA GEL PROTI POTENJU

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninu. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Gel proti potenju

Zdravilna učinkovina : metenamin.

1 g mazila vsebuje 150 mg metenamina.

Pomožne snovi: prečiščena voda, glicerol, natrijev karmelozat, eterično olje poprove mete.

Izgled zdravila Gel proti potenju in vsebina pakiranja

Prosojen, brezbarven do rahlo rumen gel z vonjem po poprovi meti (mentolu).
Pakiranje: škatla s 40 g gela v laminatni tubi.

Način izdaje zdravila Gel proti potenju

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
Gel proti potenju je galenski izdelek.

Izdeluje

Celjske lekarne, Galenski laboratorij,
Vodnikova 1, Celje

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne julij 2017

V02-00-20-06-17