

# WAYA Lax®



## DE AT MEDIZINPRODUKT ZUR BEHANDLUNG VON VERSTOPFUNG | Makrogol 4000 10 g

### Orale Lösung in Beuteln zur direkten Einnahme, mit Zitrusgeschmack

**Inhaltsstoffe:** Gereinigtes Wasser, Macrogol 4000, Citronensäure, Zitrusaroma, Kaliumsorbitat, Natriumbenzoat, Sucralose.

**Verpackung:** WAYA Lax® ist in 10 Einzeldosisbeuteln zu je 20 ml erhältlich.

**Wirkungsweise:** Macrogol 4000 ist ein inertes, wasserlösliches Polymer mit hohem Molekulargewicht. Es ist in der Lage, das zur Einnahme verwendete Wasser zu binden und im Stuhl zurückzuhalten. Es fördert somit die Rehydratierung und Erweichung des Stuhls und erleichtert die Darmentleerung. Es beschleunigt die Darmpassage und stimuliert die Peristaltik. Es wird im Verdauungstrakt weder absorbiert noch metabolisiert und führt nicht zu einem Ungleichgewicht im Elektrolythaushalt, wenn es mit der angegebenen Flüssigkeitsmenge eingenommen wird.

**Indikationen:** Symptomatische Behandlung von Verstopfung. WAYA Lax® fördert die Peristaltik und trägt zu einer angemessenen Darmentleerung bei, wodurch Verstopfung entgegengewirkt und Koprostase (Kotstau) verhindert wird.

**Warnhinweise:** Die Anwendung bei Kindern muss unter direkter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen. Halten Sie vor der Anwendung während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit Rücksprache mit Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin. Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum. Nicht verwenden, wenn die Packung geöffnet oder beschädigt ist. Das Produkt kann die Darmassage verkürzen und damit die Aufnahme von oral verabreichten Arzneimitteln verringern. Es ist daher ratsam, bei gleichzeitiger Einnahme von oralen Arzneimitteln, die in jedem Fall in einem Abstand von mindestens 2 Stunden eingenommen werden sollten, Ihren Arzt / Ihre Ärztin zu konsultieren. Das Produkt kann zu einer möglichen Wechselwirkung führen, wenn es zusammen mit stärkebasierten Lebensmittelverdickungsmitteln verwendet wird. Der Inhaltsstoff Macrogol wirkt der verdickenden Wirkung von Stärke entgegen und verflüssigt Präparate, die bei Menschen mit Schluckbeschwerden dickflüssig bleiben müssen. Bei Auftreten von unerwünschten Wirkungen das Produkt absetzen und einen Arzt / eine Ärztin aufsuchen.

**Kontraindikationen:** Verwenden Sie WAYA Lax® in den folgenden Fällen nicht:

- bekannte Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe
- paralytischer Ileus
- Darmperforation, Darmverschluss oder Stenose

## SI MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA LAJŠANJE TEŽAV ZARADI ZAPRTJA | Makrogol 4000 10 g

### Peroralna raztopina v vrečkah za direktno zaužitje, z okusom citrusov

**Sestavine:** Prečiščena voda, makrogol 4000, citronska kislina, aroma citrusov, kalijev sorbat, natrijev benzoat, sukalzoza.

**Obljika pakiranja:** WAYA Lax® je peroralna raztopina, na voljo v 10 vrečkah za enkratno uporabo, po 20 ml.

**Način delovanja:** Makrogol je inerten vodotopni polimer z visoko molekulsko maso. Sposoben je tvoriti vezi z vodo in jo zadrževati v blatu. Spodbuja rehidracijo, mehča blato in olajša izločanje blata. Pospešuje prehod skozi črevesje in spodbuja peristaltiko. V prebavilih se na absorbira ali presnavlja. Ob zaužitju s predpisano količino tekočine ne povzroča elektrolitskega neravnovesja.

**Indikacije:** Simptomska lajšanje zaprtja. WAYA Lax® spodbuja peristaltiko in pomaga pri ustrezrem praznjenju črevesja, s čimer preprečuje zaprtje in zagozdenje blata.

- schwere entzündliche Erkrankungen des Darms (z. B. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, toxisches Megakolon).

Die Verwendung von Abführmitteln ist kontraindiziert bei akuten Bauchschmerzen, Bauchschmerzen unbekannter Ursache, Übelkeit und Erbrechen, rektalen Blutungen unbekannter Ursache oder bei schwerer Dehydratation.

#### Einnahme und Dosierung:

Empfohlen für Erwachsene und Kinder über 12 Jahre.

- 1 bis 4 Beutel täglich

Die Dosierung sollte je nach individuellem Ansprechen auf die Behandlung erhöht oder verringert werden, um eine regelmäßige Darmentleerung mit weichem Stuhl zu fördern. Die Höchstdosis beträgt normalerweise nicht mehr als 4 Beutel pro Tag. Die orale Lösung ist gebrauchsfertig. Unmittelbar nach der Einnahme von WAYA Lax® müssen pro Beutel etwa 125 ml Wasser getrunken werden. Bei Einnahme der Mindestdosis (1 Beutel täglich) wird empfohlen, das Produkt morgens einzunehmen. Bei höherer Dosierung die Einnahme auf den Morgen und den Abend aufteilen. Wenn sich die Beschwerden nach 7 Tagen Behandlung noch nicht gebessert haben, wird empfohlen, einen Arzt / eine Ärztin aufzusuchen. Wirkt innerhalb von 24-72 Stunden.



**Nebenwirkungen:** Es können Magen-Darm-Beschwerden auftreten (Bauchschmerzen, Blähungen, abdominale Distension, Übelkeit, Stuhlinkontinenz). Durchfall ist eine Folge übermäßiger Dosen von WAYA Lax® und kann durch Verringerung der Einnahmedosis vermieden werden. In seltenen Fällen wurde über Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschlag) infolge der Anwendung von Produkten, die Macrogol enthalten, berichtet. In diesem Fall die Einnahme abbrechen und ärztlichen Rat einholen.

**Hinweise zur Lagerung:** Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren. Trocken und kühl, vor Licht und Wärmequellen geschützt lagern. Das Verfallsdatum bezieht sich auf ein korrekt gelagertes Produkt.

**■ Biofarma – Via Castelliere 2 – Mereto di Tomba (UD)**  
– Italien

**Vertrieb:** Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15,  
A-2345 Brunn am Gebirge

Medizinprodukt 0373

Datum der letzten Überarbeitung: Juli 2023

**Opozorila:** Priporočamo, da se pred uporabo izdelka pri otrocih posvetujete z zdravnikom. Otroci morajo pripravek uporabljati pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Med nosečnostjo in dojenjem se pred uporabo izdelka posvetujte z zdravnikom. Izdelka ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenem na embalaži. Izdelka ne uporabljajte, če so embalaža ali vrečice odprtne ali poškodovane. Izdelek lahko skrajša čas prehoda skozi prebavila in s tem zmanjša absorpcijo zaužitih zdravil. Zato je priporočljivo, da se pri sočasnem jemanju izdelka WAYA Lax® in zdravil posvetujete z zdravnikom. V vsakem primeru pa zdravila vzmetite najmanj z dvournim razmakom. Izdelek lahko povzroči medsebojni učinek, če ga uporabljate z zgoščevalci hrane na osnovi škraba. Sestavina makrogol izčini učinek zgoščevanja škraba in lahko utekočini pripravke, ki morajo sicer ostati gosti za ljudi z motrnimi požiranjem (disfagija). Če opazite neželene učinke, prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte z zdravnikom.

**Kontraindikacije:** Izdelka WAYA Lax® ne uporabljajte v primeru:

- znane preobčutljivosti na eno ali več sestavin
- paritaličnega ileusa (zmanjšana ali odstopna črevesna peristaltika)
- predtrja črevesja, zapore ali stenoze (zožitev črevesa)
- hude vnetne bolezni črevesja (npr. ulcerozni kolitis, Chronova bolezen, toksični megakolon)

Uporaba odvaja je kontraindicirana pri akutni trebušni bolečini, trebušni bolečini neznanega izvora, slabosti in bruhanju, rektalni krvavitvi neznanega izvora ali pri hudi dehidraciji.


**Odmjerjanje in način uporabe:**

Odmrasi in otroci, starejši od 12 let:

- 1 do 4 vrečke na dan.

Odmerek povečajte ali zmanjšajte tako, da dosežete redno izločanje mehkega blata – odziv pri uporabi izdelka je individuelen. Maksimalni odmerek običajno ne preseže 4 vrečke na dan. Vsebinsko vrečke, zaužite tako, kot je. Tako pa zaužitju vrečke Waya Lax® morate spit 125 ml vode za vsako uporabljenou vrečko.

Če jemljete najmanjši odmerek (1 vrečka na dan), priporocamo, da izdelek zaužijete zjutraj. Za večje odmerke razdelite vnos med jutrom in večerom.



**(H) ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ A SZÉKREKEDÉS ENYHÍTÉSÉRE | Makrogol 4000 10 g Fogyasztásra kész belsőleges szuszpenzió tasakban, citrus ízesítéssel**

**ÖSSZETEVKŐK:** Tisztított víz, makrogol 4000, citromsav, citrusaroma, kálium-szorbat, nátrium-benzoát, szukralóz.

**KISZERELÉS:** A WAYA Lax® 10 db egyadagos tasakot tartalmaz, egy tasak tartalma 20 ml.

**HATÁSMECHANIZMUS:** A makrogol egy nagy molekulatömegű, inert, vízen oldódó polimer, amely képes megkötni a bevételelhez elfogyasztott vizet és azt megtartani a székletben. Elsősorban a széklet rehidratációját és lágyítását, és íly módon a széklet áthidalás idejét, serkentve a bélmozgást. Nem szívódik fel és nem metabolizálódik a béltraktusban. Ha a javasolt folyadékmenyiséggel veszi be, nem borítja fel az elektrolit-egyensúlyt.

**JAVALLATOK:** A székrekedés tüneteinek kezelésére. A bélmozgás fokozásával elősegíti a belek megfelelő ürítését, így hatva a székrekedés ellen és megakadályozva a székletimpaktációk kialakulását.

**FIGYELMEZTETÉSEK:** Gyermekek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett szedhetik a készítményt.

Terhesség vagy szoptatás esetén beszélje meg a készítmény alkalmazását kezelőorvosával.

Ne alkalmazza a terméket a csomagoláson feltüntetett szavatossági idő lejárta után. Ne használja fel, ha a csomagolás sérült vagy nyitott. A készítmény lerövidítheti a beleken való áthidalás idejét, így csökkenve a szájon át szedett gyógyszerek felszívódását, ezért más gyógyszerekkel való egyidejű szedése esetén azt javasoljuk, beszéljen kezelőorvosával. Bárminyen egyéb gyógyszert legalább két óra eltéréssel vegyen be. A készítmény reakcióba léphet az élelmiszerben található keményítő alapú sűrítőanyaggal. A makrogol összetevő ellenyoza a keményítő sűrítő hatását, folyékonná téve olyan készítményeket, amelyeknek sűrűnek kell maradniuk, hogy nyelési problémákkal küzdök fogyasztáshakká.

Bárminyi nemkívántás reakció esetén hagyja abba a készítmény szedését és beszéljen kezelőorvosával.

**ELLENJAVALLATOK:** Ne használja a WAYA Lax® készítményt az alábbi esetekben:

- a készítmény bármely összetevőjével szemben fennálló ismert túlerzékenység,
- paritalitus iileus,

Če se po 7 dneh uporabe izdelka simptomi ne izboljšajo, priporocamo, da se posvetujete z zdravnikom.

Deluje v 24 – 72 urah.

**Neželeni učinki:** Lahko se pojavi prebavne motnje (trebušna bolečina, napihnjenost, trebušna distenzija, slabost, uhajanje blata).

Driska je lahko posledica prevelikega odmerka pripravka WAYA Lax® in se ji lahko izognete z zmanjšanjem odmerka. Redko so poročali o preobčutljivostnih reakcijah (kožni izpuščaji) po uporabi izdelkov, ki vsebujejo makrogol. Če se pojavi preobčutljivostna reakcija, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

**Shranjevanje:** Shranjujte izven dosega otrok.

Shranjujte na suhem in hladnem mestu, zaščiteno pred svetlobo in viri topote.

Rok uporabnosti velja za pravilno hranjen izdelek.

**■ Biofarma – Via Castelliere 2 – Mereto di Tomba (UD) – Italija | Distributer:** Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana

Medicinski pripomoček



Datum zadnje revizije navodila: julij 2023

- a belek perforációja, elzáródása vagy szükülete,
- a béltraktus súlyos gyulladásos megbetegedése (pl. colitis ulcerosa, Chron-betegség, toxikus megacolon) esetén.

A hashajtó használata ellenjavalt akut hasi fájdalom, tisztaztalan eredetű hasi fájdalom, émelygés, hányás, tisztaztalan eredetű rektális vérzés vagy súlyos kiszáradás esetén.

**ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS:**

Felnőtteknél és 12 éven felüli gyermekeknek javallott

- napi 1–4 tasak

Az adagolást a kezelésre adott egyéni reakció szerint kell csökkenteni vagy növelni annak érdekében, hogy a beteg rendszeresen puha székletet tudjon üríteni. A napi 4 tasakos maximális adagot általában nem szabad túllépni. A belsőleges szuszpenzió a tasakban talált formájában kell elfogyasztani. Közvetlenül a készítmény bevételelét követően igyon meg minden elfogyasztott tasak után 125 ml vizet. Ha a minimális adagot (napi 1 tasak) fogyasztja, akkor javasolt a készítményt reggel bevenni. Ha ennél többet vesz be, javasolt a bevitelt reggeli és esti adagokra osztani. Ha a kezelést kezdetétől számított 7 napon belül sem javul az állapotára, keresse fel kezelőorvosát.

**Hatóidő:** 24–72 óra

**MELLÉKHATÁSOK:** Előfordulhatnak gyomor-bélrendszeri zavarok (hasi fájdalom, puffadás, hasi feszülés, émelygés, székletérinténtionitivitás). A hasmenés azzal jelzi, hogy túl sokat vett be a WAYA Lax® készítményből. Ezt az adagolás csökkentésével elkerülheti.

Ritkán előfordulnak túlerzékenységi reakciók (bőrkiütés) a makrogol tartalmú készítményekkel szemben. Ha ilyet tapasztal, hagyja abba a készítmény szedését, és beszéljen kezelőorvosával.

**TÁROLÁS:** Gyermekktől távol tartandó. Száraz, hűvös helyen tárolja, fénytől és hőtől védve. A lejárati idő megfelelő körülmejék között tárolja merevnakonatkozik.

**■ Biofarma – Via Castelliere 2 – Mereto di Tomba (UD) – Olaszország | Forgalmazó:** Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Szlovénia – Tel.: 06 23 801 028

Orvostechnikai Eszköz 0373

Szöveg utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2023. július  
(IFU1\_07/23r0\_07/23)

MEDIS