

SESTAVA

LISTI VEDNOZELENEGA GORNIKA (*Uvae ursi folium*) - 40,0 %, ZEL PRESLICE (*Equiseti herba*) - 20 %, KORENIKA GLADEŽA (*Ononidis radix*) - 10 %, KORENIKA PLAZEČE PIRNICE (*Graminis rhizoma*) - 10,0 %, LISTI POPROVE METE (*Menthae piperitae folium*) 10,0 %, LISTI BREZE (*Betulae folium*) - 10,0 %.

DELOVANJE

Vednozeleni gornik spodbuja izločanje urina in zavira rast številnih bakterij in glivic. Plazeča pirnica, preslica, gladež in breza delujejo diuretično, listi poprove mete pa so dodani predvsem za izboljšanje okusa. Čaj se uporablja za kratkotrajno zdravljenje (največ 1 teden) blažjih vnetij sečil, ko zdravljenje z antibiotiki ni potrebno, oziroma v dogovoru z zdravnikom tudi za podporno zdravljenje ob sočasnem zdravljenju težav z drugimi zdravili.

UPORABA

Žlico čajne mešanice prelijte z 200 ml vrele vode, čez 15 minut precedite in popijte do 5 skodelic na dan. Če imate občutljiv želodec, 1 žlico čajne mešanice prelijte z 200 ml neoporečne hladne vode. Pustite stati najmanj 30 minut in vmes večkrat premešajte, nato precedite in takoj popijte. Precejen čaj lahko pred zaužitjem na hitro prevrete in popijete še toplega. Priporočamo 3-5 skodelic sveže pripravljenega čaja na dan.

OPOZORILO

Ne uporabljajte ob preobčutljivosti na vsebovane ali sorodne rastline, ob funkcionalni okvari ledvic ali če je iz kakršnega koli drugega razloga potrebno omejiti dnevni vnos tekočine, v obdobju nosečnosti in dojenja ter pri otrocih, mlajših od 12 let. Če se stanje ne izboljša v 2 dneh ali se ponavlja, priporočamo posvet z zdravnikom. Za težavami z izločanjem urina pri moških se lahko skriva prikrito obolenje prostate. Če se v urinu pojavi kri, če nastopi zvišana telesna temperatura ali če je uriniranje boleče in ga spremljajo krči, obiščite zdravnika. Zdravljenja brez posveta z zdravnikom ne ponovite več kot 5x letno. Čaju lahko dodate noževno konico sode bikarbone ali v času zdravljenja uživajte več zelenjave in mlečnih izdelkov ter manj kisle hrane (sadja in sadnih sokov) in mesa. Zdravila, ki zvišajo kislost urina, lahko zmanjšajo učinkovitost. Sočasna uporaba vitamina C ni priporočljiva. Urin se ob uporabi čaja prehodno lahko obarva zelenkasto rjavo.

NEŽELENI UČINKI

V posameznih primerih, zlasti pri osebah z občutljivo želodčno sluznico, sestavine lahko povzročijo draženje želodca s slabostjo, bruhanjem in bolečinami. Lahko se pojavijo kožne preobčutljivostne reakcije. Pogostnost ni poznana.

SHRANJEVANJE



Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte tesno zaprto pri temperaturi do 25°C.

CELJSKE LEKARNE
GALENSKI
LABORATORIJ

ČAJ ZA LEDVICE IN MEHUR II

ZDRAVILNI ČAJ. GALENSKI IZDELEK.



Izdeluje:

Celjske lekarne
GALENSKI LABORATORIJ
Vodnikova ulica 1, Celje

Izdaja zdravila je
brez recepta v lekarnah.

Vsebina: 70 g



V01-00-18-04-25



Čaj za ledvice in mehur II